

Wegovy® es un medicamento inyectable recetado para tratar a adultos con esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (MASH, por sus siglas en inglés) con cicatrización del hígado (fibrosis) de moderada a avanzada, pero no con cirrosis hepática, junto con una dieta baja en calorías y mayor actividad física. Esta indicación está aprobada basada en la mejora de MASH y la cicatrización del hígado. Actualmente se está llevando a cabo un estudio para confirmar el beneficio clínico de Wegovy® en adultos con MASH. Wegovy® contiene semaglutida y no debe usarse con otros productos que contengan semaglutida ni con otros medicamentos agonistas del receptor del GLP-1.

¿Vas a comenzar el tratamiento para MASH? Habla con tu médico sobre MASH y Wegovy®

Si estás considerando Wegovy® o ya te lo han recetado como parte de tu plan de tratamiento de MASH, es posible que tengas preguntas sobre qué esperar. Esta guía puede ayudarte a prepararte para tu próxima cita y a comprender los posibles efectos secundarios.



Prepárate.

Anota cualquier pregunta o inquietud que tengas, junto con una lista de los medicamentos o suplementos que tomas. Comparte esto con tu profesional de la salud para ayudar a determinar si Wegovy® es adecuado para ti.



Mantén una actitud abierta.

Comenta cualquier síntoma o efecto secundario que hayas tenido con Wegovy®. Tu profesional de la salud puede ayudarte a manejarlos.



Participa activamente.

Toma notas durante tu cita para que puedas revisar y recordar los puntos clave más tarde.

Imprime esta guía y utiliza el espacio debajo de cada pregunta para tomar notas.

Lee sobre los efectos secundarios a continuación y en la siguiente página.

¿Qué es Wegovy®?

Wegovy® (semaglutide) injection 2.4 mg es un medicamento inyectable recetado que se usa con un plan de alimentación bajo en calorías y un aumento de la actividad física para:

- tratar a adultos con esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (MASH, por sus siglas en inglés) con cicatrización del hígado (fibrosis) de moderada a avanzada, pero no con cirrosis hepática.

Esta indicación está aprobada basada en la mejora de MASH y la cicatrización del hígado. Actualmente se está llevando a cabo un estudio para confirmar el beneficio clínico de Wegovy® en adultos con MASH.

Wegovy® contiene semaglutida y no debe usarse con otros productos que contengan semaglutida ni con otros medicamentos agonistas del receptor del GLP-1.

Se desconoce si Wegovy® es seguro y eficaz para:

- el tratamiento de MASH en personas menores de 18 años.

Información Importante de Seguridad

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre Wegovy®?

Wegovy® puede causar efectos secundarios graves, que incluyen:

- **Posibles tumores de tiroides, incluido cáncer.** Informa a tu proveedor de atención médica si presentas un bulto o hinchazón en el cuello, ronquera, dificultad para tragar o falta de aliento. Estos pueden ser síntomas de cáncer de tiroides. En estudios con roedores, Wegovy® y los medicamentos similares a Wegovy® causaron tumores de tiroides, incluido el cáncer de tiroides. Se desconoce si Wegovy® causará tumores de tiroides, incluido un tipo de cáncer de tiroides llamado carcinoma medular de tiroides (CMT), en las personas.
- No uses Wegovy® si tú o algún miembro de tu familia ha tenido alguna vez un tipo de cáncer de tiroides llamado carcinoma medular de tiroides (CMT) o si tienes una enfermedad del sistema endocrino llamada síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (NEM 2).

No uses Wegovy® si:

- Tú o algún miembro de tu familia ha tenido alguna vez un tipo de cáncer de tiroides llamado carcinoma medular de tiroides (CMT) o si tienes una enfermedad del sistema endocrino llamada síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (NEM 2).
- Has tenido una reacción alérgica grave a semaglutida o a cualquiera de los ingredientes de Wegovy®. Consulta “¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Wegovy®?” para conocer los síntomas de una reacción alérgica grave.

Wegovy® FlexTouch®: No compartas tu pluma Wegovy® FlexTouch® con otras personas, incluso si se ha cambiado la aguja. Podrías transmitirles a otras personas una infección grave o contraer una infección grave de ellas.

Antes de usar Wegovy®, informa a tu proveedor de atención médica si tienes alguna otra enfermedad, incluso si tú:

- Tienes o has tenido problemas en el páncreas o los riñones.
- Tienes diabetes tipo 2 y antecedentes de retinopatía diabética.
- Tienes programada una cirugía u otros procedimientos que requieren anestesia o somnolencia profunda (sedación profunda).
- Estás embarazada o planeas quedar embarazada. Wegovy® puede dañar a tu bebé en gestación. Debes dejar de usar Wegovy® 2 meses antes de planear quedar embarazada.
- Estás amamantando o planeas amamantar. Se desconoce si Wegovy®, cuando se administra mediante inyección, pasa a la leche materna.

Informa a tu proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que tomas, incluidos los medicamentos recetados y los de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Wegovy® puede afectar la forma en que funcionan algunos medicamentos, y algunos medicamentos pueden afectar la forma en que funciona Wegovy®. Informa a tu proveedor de atención médica si estás tomando otros medicamentos para tratar la diabetes, incluidas las sulfonilureas o la insulina. Wegovy® hace más lento el vaciado del estómago y puede afectar a los medicamentos que necesitan pasar rápidamente por el estómago.

Consulta la Información Importante de Seguridad adicional en este documento. Haz [clic aquí](#) para ver la Información de prescripción, incluida la Guía del medicamento.

Seguridad y efectos secundarios de Wegovy®

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre Wegovy®?

Wegovy® puede causar efectos secundarios graves, que incluyen:

Posibles tumores de tiroides, incluido cáncer. Informa a tu proveedor de atención médica si presentas un bulto o hinchazón en el cuello, ronquera, dificultad para tragar o para respirar. Estos pueden ser síntomas de cáncer de tiroides. En estudios con roedores, Wegovy® y los medicamentos similares a Wegovy® causaron tumores de tiroides, incluido el cáncer de tiroides. Se desconoce si Wegovy® causará tumores de tiroides, incluido un tipo de cáncer de tiroides llamado carcinoma medular de tiroides (CMT), en las personas.

No uses Wegovy® si tú o algún miembro de tu familia ha tenido alguna vez un tipo de cáncer de tiroides llamado carcinoma medular de tiroides (CMT) o si tienes una enfermedad del sistema endocrino llamada síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (NEM 2).

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes de Wegovy®?

Los efectos secundarios pueden presentarse en algunos pacientes y estas experiencias pueden variar de una persona a otra. Habla con tu profesional de la salud si tienes preguntas sobre los efectos secundarios o si presentas algún efecto secundario que no desaparece o te molesta.

Los efectos secundarios más comunes de Wegovy® en adultos pueden incluir:

- Náuseas
- Mareos
- Diarrea
- Sensación de hinchazón
- Vómitos
- Eructos
- Estreñimiento
- Bajo nivel de azúcar en la sangre en personas con diabetes tipo 2
- Dolor de estómago (abdomen)
- Gases
- Cambios en la sensibilidad de la piel
- Gripe estomacal
- Dolor de cabeza
- Acidez estomacal
- Cansancio (fatiga)
- Caída del cabello
- Malestar estomacal

Pregúntale a tu profesional de la salud si Wegovy® podría ser parte de tu plan de tratamiento de MASH.

Información Importante de Seguridad (continuación)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Wegovy®?

Wegovy® puede causar efectos secundarios graves, que incluyen:

- **Inflamación del páncreas (pancreatitis).** Deja de usar Wegovy® y llama a tu proveedor de atención médica de inmediato si tienes dolor intenso en la zona del estómago (abdomen) que no se quita, con o sin náuseas o vómitos. A veces, puedes sentir el dolor desde el abdomen hasta la espalda.
- **Problemas de la vesícula biliar.** Wegovy® puede causar problemas de la vesícula biliar, incluidos cálculos biliares. Algunos cálculos biliares pueden requerir cirugía. Llama a tu proveedor de atención médica si tienes síntomas como dolor en la parte superior del estómago (abdomen), fiebre, coloración amarillenta de la piel o los ojos (ictericia) o heces de color arcilla.
- **Aumento del riesgo de bajo nivel de azúcar en la sangre (hipoglucemia), especialmente en personas que también toman medicamentos para la diabetes, como la insulina o las sulfonilureas.** Este puede ser un efecto secundario grave. Habla con tu proveedor de atención médica sobre cómo reconocer y tratar el bajo nivel de azúcar en la sangre y cómo controlar tu nivel de azúcar en la sangre antes de comenzar y mientras usas Wegovy®. Los signos y síntomas de un nivel bajo de azúcar en la sangre pueden incluir mareos o aturdimiento, visión borrosa, ansiedad, irritabilidad o cambios de humor, sudoración, dificultad para hablar, hambre, confusión o somnolencia, temblores, debilidad, dolor de cabeza, latidos cardíacos acelerados o nerviosismo.
- **Deshidratación que lleva a problemas renales.** La diarrea, las náuseas y los vómitos pueden causar una pérdida de líquidos (deshidratación), lo que puede causar problemas renales. Es importante beber líquidos para ayudar a reducir tu riesgo de deshidratación. Informa a tu proveedor de atención médica de inmediato si tienes náuseas, vómitos o diarrea que no desaparecen.
- **Problemas estomacales graves.** Se han reportado problemas estomacales, a veces graves, en personas que usan Wegovy®. Informa a tu proveedor de atención médica si tienes problemas estomacales que son graves o que no desaparecen.
- **Reacciones alérgicas graves.** Deja de usar Wegovy® y obtén ayuda médica de inmediato si tienes alguno de los síntomas de una reacción alérgica grave, como hinchazón de la cara, los labios, la lengua o la garganta; problemas para respirar o tragar; sarpullido o picazón intensos; desmayos o mareos; o latidos cardíacos muy rápidos.

- **Cambio en la visión en personas con diabetes tipo 2.** Informa a tu proveedor de atención médica si tienes cambios en la visión durante el tratamiento con Wegovy®.
- **Aumento del ritmo cardíaco.** Wegovy® puede aumentar tu ritmo cardíaco mientras estás en reposo. Informa a tu proveedor de atención médica si sientes que tu corazón late muy rápido o palpita en el pecho y esto dura varios minutos.
- **Entrada de alimentos o líquidos en los pulmones durante una cirugía u otros procedimientos que utilizan anestesia o somnolencia (sedación profunda).** Wegovy® puede aumentar la probabilidad de que entren alimentos en los pulmones durante una cirugía u otros procedimientos. Informa a todos tus proveedores de atención médica que estás usando Wegovy® antes de programar una cirugía u otros procedimientos.

Los efectos secundarios más comunes de Wegovy® podrían incluir: náuseas, diarrea, vómitos, estreñimiento, dolor de estómago (abdomen), cambios en la sensibilidad de la piel, dolor de cabeza, cansancio (fatiga), malestar estomacal, mareos, sensación de hinchazón, eructos, un nivel bajo de azúcar en la sangre en personas con diabetes tipo 2, gases, gripe estomacal, acidez estomacal y caída del cabello.

Consulta la Información Importante de Seguridad adicional en este documento. Haz clic aquí para ver la Información de prescripción, incluida la Guía del medicamento.

Wegovy® es un medicamento recetado. Te recomendamos reportar los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

Visita www.fda.gov/medwatch o llama al 1-800-FDA-1088.

ONCE-WEEKLY

wegovy®

semaglutide injection 2.4 mg

Wegovy® es una marca comercial registrada de Novo Nordisk A/S. Novo Nordisk es una marca comercial registrada de Novo Nordisk A/S. © 2026 Novo Nordisk Todos los derechos reservados. US26SN00074 julio de 2026

